

عمل ترمیمی بینی

دکتر جاودانی - 19 مهر 1401

آیا از نتیجه جراحی بینی خود ناراضی هستید و بینی شما دچار ایرادات ظاهری و مشکلات فانکشنالی شده است که اصلاً انتظار آن را نداشتید؟ آیا نتیجه عمل تان موفقیت آمیز نبوده و رویای تان از داشتن یک بینی زیبا با عملکرد مطلوب، محقق نشده است. خوشبختانه، عمل ترمیمی بینی، به دستان هنرمند بهترین جراح ترمیم بینی در تهران، سعادت آباد، شمال غرب تهران، غرب تهران، شمال تهران، می تواند این دغدغه شما را رفع نموده و با خلق یک نتیجه موفقیت آمیز، رویای شما را در داشتن یک بینی زیبا، به واقعیت مبدل کند. عمل بینی ترمیمی به مهارت و ظرافت نیاز دارد. ساختارهای بینی، بسیار ظریف هستند و بینی به عنوان برجسته ترین عضو صورت، کوچکترین ایرادات این عضو را به صورت برجسته نشان داده و حتی زیبایی سایر بخش های صورت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین می توان حدس زد که دستیابی به نتایجی منطقی و کانتوری طبیعی در این اندام، تا چه اندازه می تواند با اجرای صحیح فرایند عمل جراحی، ارتباط مستقیم داشته باشد. متأسفانه، در برخی موارد، نا آگاهی یا کوتاهی بیماران در مرحله تحقیق برای یافتن بهترین جراح بینی، نتایجی نارضایت بخش را از این فرایند بر جای گذاشته و نیاز به انجام عمل جراحی بینی ترمیمی را الزامی می نماید. دلایل مختلفی وجود دارد که به واسطه آن، بیماران، جراحی بینی ثانویه یا ریویژن بینی را برمی گزینند در این مقاله دکتر علی جاودانی توضیحات جامع و کاربردی در این خصوص مطرح نموده اند که توصیه می شود زمان بگذارید و مقاله جراحی ترمیمی بینی را تا انتها مطالعه کنید.



داوطلب ایده آل عمل ترمیمی بینی

اگر نتیجه به دست آمده از جراحی بینی اولیه صد در صد برای شما رضایت بخش نبوده و اهداف منطقی را در پی اجرای این فرایند به دنبال آن بوده اید ، به دست نیاورده اید ، داوطلب ایده آلی برای جراحی بینی ترمیمی محسوب می شوید. علائم زیر می تواند به شما در تصمیم گیری برای قرار گرفتن تحت جراحی بینی ثانویه کمک کند.

- از شکل ظاهری بینی خود ناراضی هستید. سطح عدم رضایت از نتایج به دست آمده از جراحی بینی اولیه ، یکی از مهم ترین مولفه ها در اقدام به انجام عمل بینی ثانویه محسوب می شود. اگر بینی کوچک تر ، بیشتر برآمده صورت شما بوده است یا اگر قوز روی پل بینی همچنان خودنمایی می کند یا نوک بینی شما هنوز بدشکل است یا ایرادات دیگری در بینی وجود دارد که نگاه شما را به سمت خود جلب می کند ، جراحی ریویژن گزینه ایده آل شما برای رفع این دغدغه ها خواهد بود.
- دشواری در تنفس : متأسفانه مواردی دیده می شود که به دلیل عدم تسلط کامل جراح به چارچوب و آناتومی بینی و باریک شدن بیش از حد مجاری بینی ، مشکلات عملکردی در بینی ایجاد شده و مشکلاتی برای یک تنفس راحت به وجود می آید. این یک تجربه آزار دهنده است و می تواند نیاز به یک جراحی بینی ترمیمی را الزامی نماید.
- بعد از جراحی بینی اولیه خود ، آسیب یا ضربه جدی به بینی وارد آمده و نتیجه عمل بینی اولیه را تخریب کرده است. گاهی بدشانسی به بیمار رو کرده و بعد از صرف هزینه و وقت و خلق یک نتیجه زیبا ، یک اتفاق ناخوشایند مثل تصادف یا یک مشاجره فیزیکی ، چنان آسیبی را به بینی وارد می کند که مثل یک قوطی رنگ پاشیده شده بر روی یک تابلوی زیبا ، یک اثر هنری را از بین می برد. جراحی بینی ترمیمی ، می تواند زیبایی از دست رفته را دوباره احیا کند.

بهترین زمان عمل ترمیمی بینی

مهم ترین فاکتوری که باید قبل از انجام جراحی بینی ترمیمی مد نظر قرار داده شود این است که آیا بینی بعد از عمل بینی اولیه ، به اندازه کافی برای قرار گرفتن مجدد تحت یک جراحی بینی دیگر ، بهبود پیدا کرده است یا خیر. معمولاً زمان انتظار برای قرار گرفتن تحت عمل ترمیمی بینی ، 12 ماه می باشد. در طول این مدت ، بینی شما خصوصاً در طول ماه های اولیه ، تغییرات قابل ملاحظه ای یافته و در ماه های بعد از آن ، این تغییرات ، کمتر و کمتر می شود. آنچه در طول سه ماه اول بعد از جراحی بینی اولیه ، یک مشکل عملکردی یا زیبایی به نظر می رسد ، معمولاً به طور خودبخود ، به مرور زمان ، رفع می شود. بنابراین سه ماه بعد از جراحی اولیه نمی تواند زمان خوبی برای قضاوت نتیجه جراحی باشد. اگر مشکل ، ماندگار بود می توان برای قرار

گرفتن تحت جراحی بینی ثانویه تصمیم گیری نمود. سپردن جراحی به دست یک جراح ماهر و با تجربه با بکارگیری تکنیک های پیشرفته و متناسب با نیازهای بیمار ، می تواند مشکلات موجود در بینی شما را درمان نماید.

هدف از جراحی بینی ترمیمی چیست؟

هدف اصلی از انجام این روش درمانی به منظور رفع مشکلات موجود در بینی مانند: انسداد مجاری بینی، شکل دهی نامناسب بینی، افتادگی غضروف و نوک بینی، زیادی روی در کوچک کردن و داشتن ظاهر مصنوعی بینی، باریک شدن بیش از حد بینی و عدم تقارن سوراخ ها و همچنین بروز جای زخم، گوشت اضافی و اسکار در اطراف بینی می باشد.

مزایای عمل ترمیمی چیست؟

سلامتی: در صورتی که جراحی بینی موفق نباشد به همراه خود مشکلات تنفسی به هنگام خواب و در شرایط دیگر ایجاد می کند. بروز هرگونه مشکل در خواب در افزایش اختلالات دیگر تاثیر بسیار زیادی می گذارد، بنابراین برای افزایش سلامت و بهبود کیفیت خواب جراحی ترمیمی بسیار موثر است.

تنفس : در صورتی که پزشک مهارت کافی نداشته باشد می تواند انسداد در حفره های بینی و عدم تنفس افراد رخ دهد، بنابراین از مزایای عمل ثانویه می توان به رفع انسداد بینی و تنفس راحت نیز اشاره کرد.

اعتماد بنفس : هنگامی که انتظارات فرد در جراحی اول فراهم نمی شود و یا تغییرات مناسب برای صورت افراد نباشد، با انجام جراحی ثانویه می توان آن را تغییر داد تا بیمار اعتماد بنفس خود را مجدد به دست آورد.

اقدامات قبل از عمل ترمیمی بینی

بهترین الگو برای ترسیم بهترین طرح درمان ، از نگاه دکتر علی جاودانی ، اجرای با کیفیت تمام بخش های فرایند ، از مراقبت های قبل از عمل بنی ترمیمی گرفته تا دوره ریکاوری بعد از آن می باشد. کوتاهی بیمار در عمل کردن به توصیه های پزشک ، خط بطلان کشیدن بر فتح قله موفقیت در خلق یک نتیجه شگفت انگیز می باشد. دکتر علی جاودانی ، با اعتقاد به افزایش بهره وری بیشتر حاصل از یک کار تیمی ، اقدامات قبل از عمل بینی ثانویه را به شرح زیر مورد اشاره قرار می دهد:

1. 3 تا 4 هفته قبل از عمل ترمیمی بینی کلیه تست های توصیه شده توسط پزشک را انجام داده و نتیجه را نزد او ببرید. پزشک از نتیجه آزمایشات در ترسیم طرح درمان استفاده می کند.


2. هماهنگی های لازم برای مرخصی گرفتن از محل کار جهت سپری کردن دوره ریکاوری را انجام دهید.
3. مصرف سیگار و محصولات وابسته به آن را که باعث کاهش کیفیت بهبود زخم و طولانی شدن فرایند بهبود و بر جای ماندن جای زخم می شود را ترک کنید.
4. 2 هفته قبل از جراحی ترمیمی بینی ، از خوردن و نوشیدن مکمل هایی که خطر خونریزی و کبودی را افزایش می دهد خودداری کنید. بعلاوه ، مصرف ایبوپروفن ، آسپرین ، ویتامین E ، روغن ماهی امگا 3 ، آجیل ، آووکادو و الکل ممنوع می باشد.
5. کلیه داروهای تجویز شده توسط پزشک برای مصرف در دوره بعد از عمل بینی ترمیمی را تهیه کنید.
6. 1 هفته قبل از جراحی بینی ترمیمی ، هماهنگی های لازم را با یکی از دوستان یا نزدیکان جهت بر عهده گرفتن مسئولیت رانندگی و بازگرداندن شما به منزل بعد از جراحی ترمیمی دماغ ، انجام دهید.
7. دو روز قبل از عمل ترمیمی بینی ، مصرف قرص های آرنیکار را آغاز کنید.
8. از شب قبل از جراحی ریویژن بینی ، چیزی نخورید و ننوشید.
9. در روز جراحی ، از انداختن زیور آلات یا آرایش کردن خودداری کنید.
10. بهتر است از جراحی اولیه 6 ماه الی 1 سال گذشته باشد.
11. جراحی با تجربه بالا در تکنیک ثانویه را انتخاب کنید.
12. نگاه واقع گرایانه ای به این نوع جراحی داشته باشید.
13. در انتخاب جراح بینی خود حساس بوده و بهترین را انتخاب کنید.
14. حتما توصیه های پزشک را درباره جراحی ثانویه به خوبی گوش دهید.



نقش پوست در عمل بینی ترمیمی

پوست مانند کاور ، ساختار و کانتور بینی را پوشش داده و در حالت ایده آل ، نتیجه زیبای عمل جراحی را به نمایش می گذارد. ضخامت پوست نقش مهمی در سرعت فروکش کردن تورم بخصوص در جراحی ترمیمی بینی دارد. در جراحی بینی ترمیمی ، پزشک باید با بافت اسکار زیر پوست و نیز ضخامت پوست مقابله کند. در واقع این چالشی است که جراح بینی ترمیمی با آن دست و پنجه نرم می کند. مقدار اسکار و بافت سفتی که بعد از رینوپلاستی اولیه شکل گرفته است ، اغلب در بیماران دارای پوست بینی ضخیم تر ، بیشتر است و همین امر ، فرایند عمل بینی ثانویه را دشوار تر می کند. اینجاست که مهارت و تجربه دکتر خوب عمل ترمیمی بینی ، پا به میدان می گذارد و با به کار گیری دستاوردهایی منحصر به فرد و بهبود شکل ظاهر و عملکرد بینی ، بهبود چشمگیری را خلق می نماید.

به کار گیری گرافت در عمل جراحی بینی ثانویه



جراح بینی ترمیمی از انواع گرافت های غضروفی در فرایند ترمیم بینی استفاده کرده و در خصوص بهترین گزینه با بیمار خود گفتگو می کند. هر نوع غضروفی دارای مزایا و معایب خود را دارد به طور کلی ، جراح عمل بینی ثانویه در تهران ، نقش مهمی در تعیین بهترین گزینه برای خلق بهترین نتیجه دارد.

غضروف سپتوم ، غضروفی است که از سپتوم یعنی دیواره جدا کننده حفره بینی گرفته می شود. در عمل ترمیمی بینی ، اغلب این بخش از بینی به دلیل آسیب های وارد شده در جراحی اولیه ، اغلب فاقد مقدار کافی غضروف ، جهت استفاده در طول فرایند عمل بینی ترمیمی می باشد.

گرافت غضروف گوش تکنیک دیگری است که در طول آن ، جراح بینی ترمیمی ، از غضروف گوش برای ترمیم بینی و تغییر شکل ظاهری بینی استفاده می کند. غضروف گوش در مقایسه با غضروف سپتوم نرم تر است و دارای قابلیت شکل دهی بهتر می باشد.

گرافت غضروف دنده نیز دارای آن مزیت است که به مقدار زیاد ، بدون بوجود آوردن اختلال در عملکرد دنده ها ، قابل برداشت می باشد. این غضروف ، سفت تر است.

تکنیک گرافت غضروف ، طی فرایند جراحی ترمیمی بینی به روش باز انجام می شود و زمانی که جراح ، به اصلاحات مورد نظر دست پیدا کرد ، برش کوچک ایجاد شده در پوست بینی در موقعیت استراتژیک با استفاده از بخیه های جذبی یا غیر جذبی ، بسته می شود.

پروتز در جراحی بینی ترمیمی

استفاده از پروتز در جراحی بینی ترمیمی



پروتز ، ایمپلنتی است که به صورت یک جسم خارجی در بدن قرار داده می شود. این ایمپلنت ها اغلب از جنس سیلیکون یا گورتکس هستند و قطعه های بی خطری برای بدن می باشند که به صورت سفارشی ، متناسب با نیازهای بینی بیمار جهت ترمیم ، قابل تهیه می باشند.

عمل ترمیمی بینی چگونه انجام می شود؟

بیمارانی که به دنبال عمل بینی ثانویه یا ریویژن بینی هستند ، بعلاوه تجربه ناموفق خود در عمل اولیه ، در خصوص یافتن بهترین جراح بینی ترمیمی در تهران ، که از مهارت ها تجربه لازم برای یک دکتر جراحی ترمیمی بینی خوب برخوردار باشد ، با چالش هایی روبرو می شوند. این یک دغدغه مشترک برای تمام بیماران داوطلب عمل ثانویه بینی ، صرفنظر از محل سکونت آنها می باشد. پس صرفنظر از اینکه شما ساکن پایتخت ایران ، تهران باشید و به دنبال بهترین دکتر عمل ترمیمی بینی در تهران بگردید یا این جستجو را در سایر شهرهای کشور انجام دهید ، هدف یکی است. جراحی ثانویه بینی بر روی هر بیماری انجام می شود که عمل رینوپلاستی اولیه او ناموفق بوده و قصد دارد با جراحی مجدد بینی برای بار دوم یا سوم این ایرادات را رفع نماید. نحوه عمل بینی ترمیمی بنا به دلایل متعدد ، یک فرایند دشوار محسوب می شود.

جراحی مجدد بینی به روش بسته یا روش باز انجام می شود. در این فرایند ، اغلب پیوند غضروف برای پشتیبانی ساختار نوک و پل بینی مورد استفاده قرار می گیرد. غضروف سپتوم اغلب مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موارد ، از غضروف سایر بخش های بدن مثل گوش و دنده استفاده می شود. بعد از رفع نواقص و ایرادات ، مراقبت های بعد از جراحی بینی ترمیمی در تهران ، درست مثل عمل جراحی اولیه ، لازم الاجرا می باشد. بیشتر بیمارانی که از نتیجه عمل خود ناراضی هستند ، از نتیجه ریویژن بینی خود راضی و خشنود خواهند بود.

عمل ترمیمی بینی چقدر طول می کشد؟

جراحی بینی ثانویه فرایندی است که تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و مدت اجرای آن به علت پیچیده تر بودن آن در مقایسه با جراحی اولیه ، طولانی تر است. رینوپلاستی ترمیمی اغلب به 3 الی 4 ساعت زمان جهت تکمیل نیاز دارد.

عمل ترمیمی بینی تنها به این معنی نیست که یک بار عمل بر روی بینی شما انجام شده و به دلیل مطلوب نبودن نتیجه درمان ، جراحی برای بار دوم مورد نیاز است. در برخی موارد ، بیمار قبلاً چندین بار تحت جراحی بینی قرار گرفته است. متأسفانه این تجربه تلخ ، ماحصل بی دقتی در انتخاب جراح بینی خوب است که بتواند با یک بار جراحی بر روی بینی ، نتیجه تحسین برانگیزی را خلق کرده و بیمار را از قرار گرفتن تحت جراحی ثانویه یا ثالث معاف نماید. افرادی که از نتیجه جراحی یا جراحی های قبلی خود راضی نبوده و از موقعیت فیزیکی

مطلوبی در بینی برخوردارند ، داوطلبین ایده آل برای عمل بینی ترمیمی محسوب می شوند. همچنین سیگاری نبودن و برخورداری از یک سبک زندگی سالم نیز می تواند فرد را برای قرار گرفتن تحت این عمل ثانویه مستعد تر نماید.

جلسه مشاوره با بهترین جراح بینی ترمیمی

همانطور که پیشتر در بخش انتخاب بهترین جراح بینی ذکر شد ، عمل بینی ترمیمی یک فرایند بسیار حساس می باشد که انتخاب بهترین جراح عمل بینی ترمیمی ، یک امر الزامی و ضروری در آن محسوب می شود. دکتر علی جاودانی بهترین جراح بینی ترمیمی ، جلسه مشاوره را یکی از بخش های مهم در کل فرایند معرفی کرده و برگزاری آن را برای کسب اطلاعات مورد نیاز جهت ترسیم بهترین طرح درمان ، ضروری می داند.

در طول جلسه مشاوره ، پزشک در خصوص تمام جزئیات جراحی قبلی شما سوالاتی را می پرسد. امروزه تکنیک های مختلفی وجود دارد که جراح با استفاده از آنها به اجرای فرایند می پردازد. کسب اطلاعات جامع تر در طول جلسه مشاوره می تواند پزشک را در انتخاب بهترین تکنیک ، یاری رساند. در طول این جلسه ، پزشک درباره دغدغه ها و انتظارات تان از نتیجه جراحی ترمیمی بینی ، سوالاتی می پرسد. او از شما می خواهد تا به طور شفاف آنچه در بینی تان برایتان آزار دهنده است ، بیان کنید. در صورت منطقی بودن و قابل تأیید بودن انتظارات شما از نتیجه جراحی بینی ترمیمی از نگاه بهترین جراح بینی ، او طرح درمان را به سمت این اهداف جهت یابی می کند.

بر اساس سابقه پزشکی بیمار ، جراح باتجربه شما ، زمان مناسبی را برای اجرای فرایند درمان برای شما مقرر می کند. با توجه به اینکه شما قبلاً تحت جراحی بینی اولیه قرار گرفته اید ، از اینرو لازم است بدن و بینی شما ، در شرایط مساعد برای قرار گرفتن تحت عمل بینی ثانویه قرار داشته باشند.

آیا عمل بینی ترمیمی در مقایسه با عمل بینی اولیه دردناک تر است؟

عمل بینی ثانویه و اولیه هر دو از نظر سطح درد ، در یک ردیف مشابه قرار دارند ، ولی با توجه به اینکه بینی یک بار دستخوش تغییر قرار گرفته است ، چارچوب آن اندکی حساس تر است. در جراحی ثانویه بینی ، الگوی وسیعی از عمل جراحی ، از ایجاد تغییرات جزئی در نوک بینی گرفته تا درمان یک ناحیه کوچک ، برای قرار دادن استخوان ها و غضروف بینی در موقعیت مناسب و خلق شکل و چارچوب مطلوب گسترده شده است. به عبارت دیگر ، می توان گفت که با توجه به متفاوت بودن نوع عملیات اجرایی بر روی بینی در عمل بینی ترمیمی ، می توان گفت که تجربه درد در عمل بینی ثانویه اندکی متفاوت تر است.

مراقبت های بعد از عمل بینی ثانویه



1. بعد از جراحی بینی ترمیمی یا ریویژن زمانی که احساس خستگی کردید ، استراحت کنید. نحوه خوابیدن بعد از عمل بینی ترمیمی برای کنترل ورم ، بسیار حائز اهمیت است. با استفاده از چند بالش ، سر را در موقعیت بالاتر از بدن قرار دهید. هر روز قدم بزنید و مدت قدم زدن را بر یک مبنای روزانه افزایش دهید. بهتر است یک هفته از محل کار یا تحصیل خود مرخصی بگیرید.
2. از بلند کردن اجسام سنگین ، دوچرخه سواری ، ورزش های ایروبیک و هر گونه فعالیتی که باعث بالا رفتن فشار خون و فشار آمدن به بینی تان شود ، به مدت 2 الی 3 هفته خودداری کنید.
3. تا یک هفته بعد از عمل بینی ثانویه ، فین نکنید. در صورت نیاز به عطسه کردن ، با دهان باز عطسه کنید.
4. پایین انداختن سر بعد از عمل ترمیمی بینی اصلاً توصیه نمی شود. بینی را تا 8 هفته مالش ندهید. از کرم ضد آفتاب استفاده کرده و در موقع آرایش کردن به بینی تان فشار وارد نکنید. تا یک هفته شنا نکنید.
5. بعد از جراحی ترمیمی بینی ، احتمال ابتلا به یبوست وجود دارد. سعی کنید غذاهای حاوی فیبر را در بشقاب خود بگنجانید.

6. بهترین جراح بینی ترمیمی دستورالعمل های لازم در خصوص داروهای جدید از قبیل داروهای مسکن و آنتی بیوتیک ها را در اختیار شما قرار می دهد. اگر آسپرین و سایر داروهای رقیق کننده خون را مصرف می کرده اید ، دکتر عمل بینی ترمیمی شما ، زمان از سر گیری مجدد مصرف آنها را اعلام می نماید. بهتر است داروها را بعد از وعده غذایی میل کنید تا دچار حالت تهوع نشوید.
7. بعد از برداشته شدن گچ بینی ، شستشوی بینی با محلول سالین به شما آموزش داده می شود. به مدت 4 هفته از قرار دادن عینک بر روی بینی خودداری کنید.
8. بخش مراقبت های بعد از عمل ترمیمی بینی یا ریویژن از نظر دکتر علی جاودانی ، بهترین جراح بینی ترمیمی در تهران ، به منزله حلقه ای از یک زنجیر به هم پیوسته می باشد که کوتاهی در اجرای دقیق آن می تواند بیمار و پزشک را از رسیدن به هدف نهایی که خلق یک بینی زیبا است ، محروم گرداند.
9. عوارض حرف زدن بعد از جراحی بینی ترمیمی ، همیشه مورد اشاره قرار می گیرد. بعد از جراحی ترمیمی دماغ تا جایی که می توانید کم حرف بنزید و سعی کنید حرکات صورت خود را به حداقل برسانید. حرف زدن و جویدن غذا باعث حرکت کردن عضلات و استخوان های صورت می شود و همین امر بخش های تازه ترمیم شده بینی را تحت تاثیر قرار می دهد.
10. ورم بینی بعد از جراحی ثانویه بینی ، کاملاً طبیعی است و می توانید با مراقبت های فوق الذکر ، سطح آن را به حداقل رسانده و در کاهش سریع تر آن کمک کنید. استفاده از کمپرس یخ ، یکی از توصیه های موکدی است که جراح بینی ترمیمی ، به بیمار خود گوشزد می کند.

بهترین جراح ترمیمی بینی تهران



عمل ترمیمی بینی از لحاظ فنی یک فرایند چالش برانگیز است و باید به دست یک جراح پلاستیک با تجربه انجام شود. علت چالش بر انگیز بودن این فرایند ، متغیر بودن آناتومی بینی در افراد مختلف ، نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق تناسبات صورت و فاکتورهای دیگری می باشد که جز در سایه سال ها تجربه و دقت فوق العاده ، قابل کنترل نمی باشد. در انتخاب جراح بینی ترمیمی ، در نظر گرفتن سطح تجربه جراح و تعداد فرایند های جراحی بینی ترمیمی موفقیت آمیز انجام شده به دست او بسیار حائز اهمیت است. دکتر علی جاودانی ، بهترین دکتر بینی ترمیمی تهران ، بیان می کند که یک دکتر خوب و با تجربه عمل بینی ترمیمی ، باید از سطحی از مهارت و تجربه برخوردار باشد که بیمار بتواند با قوت قلب ، به او اعتماد کرده و رویای نهفته برخورداری از یک بینی زیبا را درخود بیدار کنند.

عکس جراحی ترمیمی بینی

در این بخش می توانید برخی از نمونه کارهای جراحی ثانویه بینی توسط دکتر جاودانی بهترین جراح بینی ترمیمی در تهران را مشاهده کنید اما برای بررسی نمونه کارهای بیشتر لطفا به گالری سایت مراجعه نمایید.

هزینه عمل بینی ترمیمی در تهران

قیمت جراحی بینی ترمیمی در تهران ، سعادت آباد فرایندی است که در طول مشاوره با جراح رینوپلاستی ثانویه مورد بررسی قرار می گیرد. بهترین جراح بینی ترمیمی به طور کامل بینی شما را مورد بررسی قرار داده و در خصوص دغدغه های فانکشنال و زیبایی تان می پرسد. او فرایند عمل اولیه شما را مورد بحث قرار داده و یک طرح درمان را برای بهبود دادن شکل و ساختار بینی به واسطه انجام رینوپلاستی ترمیمی یا ریویژن ، ترسیم می کند. دکتر جراحی بینی ثانویه ، طرح درمان کامل از جمله هزینه عمل بینی ثانویه در سعادت آباد را برای شما شرح می دهد. قیمت دقیق بر اساس پیچیدگی روند مربوط به هر فرد ، در دامنه متغیری قرار دارد. بر اساس اجرای فرایند عمل ترمیمی بینی بدون بیهوشی یا با بی حسی بعنوان یک فرایند سرپایی ، یا اجرای آن تحت بیهوشی عمومی ، هزینه امکانات فراهم شده برای اجرای پروسیجر عمل ترمیمی دماغ ، استفاده از گرافت برای پیوند غضروف ، درجه تغییرات مورد نیاز ، دستمزد جراح و دیگر هزینه های مربوط به جراحی دماغ ترمیمی ، کسب اطلاعات درباره هزینه جراحی ثانویه بینی جز در جلسه مشاوره ، از منبعی دیگری میسر نمی باشد.

عمل جراحی ترمیمی بینی در تهران

تهران ، پایتخت ایران و دومین کلان شهر پر جمعیت خاورمیانه ، کانون تمرکز بهترین جراحان بینی از جمله جراحان بینی ترمیمی است که مخاطبین بسیاری را از سراسر ایران و جهان ، به سمت خود جلب کرده است. شاید همین موضوع ، کار جستجوی بهترین جراح بینی ترمیمی در این کلان شهر را به امری چالش برانگیز

تبدیل کرده باشد. صرفنظر از اینکه ساکن تهران هستید یا از سایر شهرهای ایران یا جهان، قصد سفر به تهران و انجام عمل ترمیمی بینی خود در این شهر را دارید، توصیه دکتر علی جاودانی، بهترین جراح بینی ترمیمی در سعادت آباد، شمال غرب تهران، به شما این است که از عجله کردن در انتخاب جراح بینی ترمیمی بپرهیزید و با به خرج دادن دقت عمل و تحقیق کافی، سعی کنید گزینه ای را انتخاب کنید که نتیجه اعتماد به او برای شما، شکفتن گل لبخند رضایت در زمان مشاهده نتیجه رینوپلاستی ترمیمی بر روی لب هایتان باشد.

عکس قبل و بعد جراحی ترمیمی بینی



عوارض عمل بینی ترمیمی

بعد از جراحی بینی ترمیمی، مثل جراحی اولیه، تورم و کبودی در اطراف بینی و چشم ها و گونه ها کاملاً طبیعی بوده و حتی در صورت اجرای عمل ترمیمی بینی یا ریویژن به دست بهترین جراح بینی ترمیمی، اجتناب ناپذیر می باشد. این می تواند یک علامت واکنش طبیعی بدن در تلاش برای بهبود محسوب شده و در یک دوره چند هفته ای فروکش می کند. استفاده از کمپرس های یخ بر روی گونه ها و پیشانی می تواند به کاهش تورم و کبودی بعد از عمل بینی ثانویه کمک کند. تورم خصوصاً در نوک بینی، شدید تر بوده و تحت

عنوان ادم یا بافت مایع در پوست و بافت زیر جلدی بینی نیز خوانده می شود. هر قدر پوست بینی ضخیم تر باشد ، میزان ماندگاری ادم ، بیشتر خواهد بود. به طور کلی تورم در جراحی بینی ثانویه به روش باز در مقایسه با عمل ترمیمی دماغ به روش بسته ، طولانی تر خواهد بود.

از دیگر خطرات جراحی ترمیمی بینی می توان به خونریزی اشاره نمود که دکتر عمل بینی ترمیمی ، سطح استاندارد آن را بسیار خفیف می داند و معتقد است که این عارضه جانبی ، در موارد بسیار نادر ، در کمتر از 3٪ بیماران ، ممکن است به یک عارضه جدی تبدیل شود .بهترین دکتر عمل ترمیمی بینی در جلسه مشاوره قبل از جراحی ترمیمی دماغ ، ناهنجاری های احتمالی خونی بیمار را بررسی کرده و متناسب با آن ، برای پیشگیری از بروز عارضه جانبی جدی ، بهترین طرح درمان را ترسیم می کند.

عفونت ، عارضه جانبی دیگری است که در کمتر از 2 درصد بیماران در جراحی بینی برای بار دوم ، اتفاق می افتد. عفونت به شکل تخلیه ترشحات از بینی ، تورم و قرمزی نمایان می شود. در طول ریویژن یا جراحی مجدد بینی ، از آنتی بیوتیک به صورت تزریق درون وریدی استفاده می شود. بعلاوه آنتی بیوتیک های خوراکی نیز جهت مصرف در منزل توصیه می شود که باید دوره مصرف آن کامل شود.

تغییر در حس بویایی یا شکل گیری بافت اسکار نیز می تواند بعنوان عوارض جانبی جراحی بینی ترمیمی بعد از فرایند مورد اشاره قرار گیرد که البته ، موقتی بوده و بعد از مدت کوتاهی رفع می شود.

عمل ترمیمی بینی در مطب

جراحی بینی ثانویه ، در مطب قابل اجرا می باشد. ماهیت این فرایند به گونه ای است که می توان آن را به صورت عمل ثانویه بینی بدون بیهوشی نیز انجام داد. ولی بنا به مصلحت های بهداشتی و حفظ ایمنی و سلامت بیمار در بالاترین سطح استاندارد ، ترجیح بهترین دکتر بینی ثانویه در تهران ، انجام جراحی، در اتاق عمل است. این یکی از مکرر ترین پرسش هایی است که داوطلبین عمل بینی ترمیمی دکتر علی جاودانی ، از او می پرسند. انجام عمل ترمیمی دماغ در مطب ، تنها برای رفع ایرادات جزئی می باشد که نیازی به اجرا تحت بیهوشی ندارد. تشخیص در خصوص امکان اجرای جراحی بینی برای بار دوم در مطب یا نیاز به انجام جراحی ترمیمی دماغ در اتاق عمل ، به صلاحدید پزشک وابسته است.

عمل ترمیمی بینی با لیزر

عمل ثانویه بینی یکی از دشوارترین و پر چالش ترین فرایندها در میان جراحی های زیبایی است. فاکتورهای مختلفی جراحی بینی ترمیمی را به یک پروسه یچ پیچیده تبدیل کرده است. یکی از این فاکتورها نیاز به ایجاد

برش های مجدد در بینی است که در عمل اولیه نیز این برش ها در آن ایجاد شده است. خوشبختانه ، به مدد پیشرفت های رخ داده در حوزه تکنولوژی لیزر ، از این تکنولوژی برای ایجاد برش های مورد نیاز با حداقل خونریزی و با بیشترین ظرافت ممکن استفاده می شود. دکتر علی جاودانی بهترین جراح بینی ترمیمی در شمال غرب تهران ، سعادت آباد با بهره گیری از این تکنولوژی قادر است بهترین نتیجه را در فرایند عمل بینی ثانویه بیماران خود به دست آورد.

آیا عمل ترمیمی بینی گران تر از عمل اولیه است؟

بعید نیست که هزینه عمل بینی ترمیمی در مقایسه با جراحی اولیه بیشتر باشد. علت این است که عمل دماغ ترمیمی به علت پیچیده بودن فرایند اغلب طولانی تر است. یک عمل با روش باز ، معمولاً پنج الی شش ساعت طول می کشد و نتیجه صرف این زمان طولانی در هزینه جراحی ترمیمی بینی ، منعکس می شود. در صورتی که بینی دچار برخی از مشکلات فانکشنال باشد ، شرکت های بیمه بخشی از هزینه درمان را پوشش خواهند داد.

عمل ریویژن بینی با غضروف

تشخیص مشکلات پروسیجر قبلی تنها به رفع ایرادات ظاهری بینی محدود نمی شود. معمولاً بعد از آزمایشات دقیق ، گاهی معلوم می شود که چارچوب داخلی از جمله غضروف بینی دچار آسیب دیدگی شده است. زمانی که غضروف موجود در بینی قابلیت و توانایی پشتیبانی از یکپارچگی ساختارهای بینی را نداشته باشد ، بهترین جراح عمل ترمیمی بینی در تهران ، دکتر علی جاودانی ، پیوند غضروف را به عنوان الزامی ترین فرایند ، مورد استفاده قرار می دهد. غضروف معمولاً از سپتوم بینی ، گوش یا دنده گرفته می شود. البته ، دنده اغلب منبعی است که مورد ترجیح بیشتر جراحان ترمیمی بینی می باشد چون برش ها و اسکارها به راحتی قابل پوشش دادن می باشند و بیمار درد کمتری را تجربه می کند. غضروف های ششم و هفتم رایج ترین انواع غضروف های مورد استفاده به دلیل ساختار پایدار آنها در ناحیه آناتومیکی محسوب می شوند.

چگونه تورم بعد از جراحی بینی ترمیمی را کاهش دهیم ؟

اگر قصد انجام عمل بینی ترمیمی را دارید ، حتماً در تجربه عمل بینی اولیه خود ، در بخش مراقبت های بعد از عمل بینی اولیه خود ، توصیه های مربوط به کاهش تورم را دنبال کرده و با آن آشنایی دارید. دستورالعمل های مربوط به کنترل تورم مشابه می تواند در دوره ریکاوری عمل بینی ترمیمی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه جهت یادآوری فهرستی از عملکردهای مناسب برای کمک به کاهش تورم آمده است.

از مصرف رقیق کننده های خون قبل از جراحی و بعد از آن خودداری کنید.

از کیسه یخ بر روی گونه ها چندین بار در روز استفاده کنید. این کار را تنها در طول چند روز اول بعد از عمل بینی ترمیمی انجام دهید.

قرار دادن سر در موقعیت بالاتر نسبت به بدن می تواند به کاهش تورم کمک کند.

بهتر است در هفته منتهی به عمل بینی ترمیمی ، استعمال سیگار را ترک کنید.

در اجرای دستورالعمل های جراح بینی ترمیمی ، دقت عمل داشته باشید و صبر و حوصله به خرج دهید چون همانطور که می دانید ، طول می کشد تا تورم فروکش کند.

ریکاوری بعد از جراحی بینی ترمیمی

بعد از عمل بینی ترمیمی ، پزشک اسپلینتی را بر روی بینی شما قرار می دهد. این اسپلینت یا گچ به ساختار بینی کمک می کند تا روند بهبود بهتری را داشته باشد. گچ بینی به کاهش تورم نیز کمک کرده و تمام بخش های تغییر شکل و موقعیت داده شده را در شکل و موقعیت جدید ، حفظ می کند. این گچ برای یک دوره تقریباً یک هفته ای بعد از رینوپلاستی ترمیمی بر روی بینی باقی می ماند. دکتر علی جاودانی به بیماران خود توصیه می کند که یک دوره یک هفته ای را از محل کار یا تحصیل خود جهت سپری کردن پروسه بهبود ، مرخصی بگیرند. او بیماران خود را از انجام کارهای سنگین به دلیل تاثیر آن بر روی ساختار بینی از طریق فشار وارده ، منع می کند. اگر عینک می زنید ، از شما خواسته می شود تا دو دوره بهبود ، حتی الامکان از زدن عینک خودداری کرده و در صورت لزوم استفاده از عینک ، آن را به روی پل بینی قرار ندهید و به پیشانی تکیه دهید. در طول دوره ریکاوری ، از دارو ، پماد و اسپری های بینی برای کمک در به حداقل رساندن نتیجه به دست آمده از درمان استفاده می شود.

شما یک هفته بعد از جراحی بینی ترمیمی ، به دیدار جراح خود می روید و در این جلسه ملاقات ، پزشک گچ بینی شما را بر می دارد. بینی شما برای یک دوره موقتی تورم دارد بنابراین استرس نداشته باشید. بر حسب ویژگی های بدن بیمار ، معمولاً بخش عمده تورم در طول یک دوره 2 الی 3 هفته ای فروکش می کند. تورم باقی مانده به زمان بیشتری برای فروکش کردن نیاز دارد. دکتر علی جاودانی ، جراح بینی ترمیمی شما در تهران برای کمک به فروکش کردن تورم ، به بینی شما چسب می زند. فشار وارد آمده در اثر چسب زدن به بینی مقدار تورم را کاهش می دهد.


چسب زدن به بینی بعد از عمل بینی ترمیمی

پس از اینکه جراحی بینی ترمیمی شما به پایان رسید ، شما مرکز درمان را در حالیکه بینی تان گچ گرفته شده است ، ترک می کنید. این گچ استخوان ها و غضروفی را که در موقعیت جدید قرار داده شده است ، تحت پشتیبانی قرار می دهد. بعلاوه کمک می کند تا در طول هفته اول بهبود ، حرکت و جابجایی در بینی اتفاق نیافتد. دکتر علی جاودانی ، بهترین جراح بینی تهران از بیماران خود می خواهد تا با دقت در طول یک هفته اول بعد از عمل بینی ثانویه ، از گچ یا اسپلینت بینی خود مراقبت کنند.

یک هفته بعد از جراحی ، شما به مطب پزشک مراجعه می کنید تا لحظه هیجان انگیز برداشته شدن گچ و مشاهده بینی جدید تان را تجربه کنید. وقتی گچ بینی برداشته می شود ، پزشک بر روی پل بینی چسب می چسباند. این چسب به کنترل ادم کمک کرده و باعث می شود که پوست با شکل جدید خود سازگار شود.

مدت زمان توصیه شده برای چسب زدن به بینی بر حسب ویژگی های بینی هر بیمار متغیر می باشد و پزشک در خصوص مدت زمان مناسب برای چسب زدن به بینی با بیمار خود گفتگو می کند. به اغلب بیماران توصیه می شود که به مدت 1 الی 2 ماه بینی خود را چسب بزنند.

آموزش چسب زدن به بینی



گچ بینی در جراحی بینی ثانویه

حتماً در جراحی اولیه خود ، گچ یا اسپلینت بینی را تجربه کرده اید و باید بدانید اکنون که قصد جراحی ریبویژن بینی را دارید نیز بر روی بینی شما گچ گرفته می شود. اسپلینت بینی یک قطعه پلاستیکی ، سیلیکونی یا آلومینیومی است که در داخل یا خارج بینی بیمار برای پشتیبانی از نتیجه جراحی قرار داده شده و به استخوان و غضروف ها کمک می کند تا در محل جدید خود باقی بمانند. جراح بینی ترمیمی بر اساس نیازهای بینی شما ،

نوع اسپلینت را انتخاب می کند. گچ بینی هیچ دردی را به همراه نداشته و دوره استفاده از آن ، موقتی می باشد.

اسپلینت های داخلی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که جراحی درمان انحراف سپتوم انجام شده باشد. این دو قطعه پلاستیکی یا از جنس هر متریال انعطاف پذیر دیگر برای پشتیبانی از پل بینی بین سوراخ های بینی یا سپتوم قرار داده می شوند.

استفاده از اسپلینت خارجی در میان جراحان زیبایی کاربرد بیشتری دارد. از این قطعات برای یک دوره موقتی جهت کمک به پشتیبانی از شکل جدید بینی استفاده می شود.

اسپلینت خارجی اغلب با استفاده از چسب در محل خود ثابت می شود. مزایای استفاده از گچ بینی شامل موارد زیر می باشد:

- سپتوم بینی شما را بعد از عمل بینی ترمیمی ، در محل خود ثابت نگه می دارد.
- از شکل جدید بینی شما مراقبت می کند.
- از بینی شما در برابر آسیب دیدگی مراقبت می کند.
- به کاهش تورم کمک می کند.
- خونریزی را کنترل می کند.
- بهبود پوست و سازگار شدن آن با غضروف را سرعت می بخشد.
- تنفس بعد از عمل بینی ترمیمی را بهبود می دهد.

سوالات متداول عمل ترمیمی بینی



- پروسیجر جراحی بینی ترمیمی چقدر طول می کشد؟

پروسیجر ریویژن بینی ، بسته به دامنه تغییرات مورد نیاز ، گاه در طول یک ساعت قابل اجراء بوده و گاهی تا به دلیل پیچیده بودن اصلاحات مورد نیاز در چارچوب پایه ، به چندین ساعت زمان نیاز دارد. جراح بینی ترمیمی شما در طول جلسه مشاوره در خصوص مدت زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرای فرایند و نیز نوع بیهوشی مورد استفاده ، صحبت خواهد کرد.

- ریکاوری عمل بینی ثانویه چگونه است؟

ریکاوری در جراحی ترمیمی بینی شبیه به جراحی اولیه می باشد و به یک دوره استراحت 10 الی 14 روزه نیازمند است. گاهی اوقات بعد از تکمیل فرایند ، بر روی بینی اسپلینت قرار داده می شود تا روند بهبود با کیفیت بهتری پیش رود. بیشتر بیماران عمل دماغ ترمیمی ، بعد از یک هفته ، می توانند فعالیت های روزمره خود را از سر گیرند.

- چه زمان می توان عمل ترمیمی بینی را انجام داد؟

صبر فاکتور کلیدی در بهبود بینی بعد از عمل اولیه است. به بیشتر بیماران داوطلب عمل جراحی بینی ثانویه که از نتیجه عمل اولیه خود ناراضی بوده و متقاضی رینوپلاستی ترمیمی هستند خواسته می شود تا صبر و حوصله به خرج دهند تا بینی آنها از فرایند اول ، به بهبود کامل برسد تا بتوان این عمل ریویژن را بر روی آن اجرا نمود.

- چگونه بفهمیم که به جراحی بینی ترمیمی نیاز داریم؟

داوطلبین ایده آل برای عمل دماغ ترمیمی یا ثانویه افرادی هستند که می خواهند ایرادات و کاستی های بر جای مانده از عمل در شکل ظاهری و عملکرد بینی خود را درمان کنند. بیماران عمل بینی ترمیمی باید انتظارات منطقی از نتیجه عمل جراحی خود داشته باشند.

- جراحی بینی ثانویه معمولا به روش بسته انجام می شود و یا باز؟

در مواقعی که میزان مشکلات موجود جراحی اولیه ناچیز باشد پزشک از روش بسته برای اصلاح آن استفاده می کند. اما در مواقعی که مشکلات بسیار زیاد باشد و به راحتی قابل تغییر نباشد به روش باز جراحی خواهد شد.

- علت دشواری جراحی بینی ترمیمی به نسبت دیگر جراحی ها چیست؟

زمانی که بینی برای اولین بار جراحی می شود، حساس و ضعیف خواهد شد. گاهی اوقات نیاز به تقویت غضروف و بافت های استخوانی نیاز داشته و جراح باید برای پیوند این غضروف ها از مناطق دیگر بدن عمل پیوند را انجام دهد.

www.javdanimd.com